

Tab. A5: Eching.

| Kriterium | Ausprägung | RD | | S/Z | | SCHW | | Sonstige | | indet. | | Gesamt | |
|--------------------------|------------------|-----|------|-----|-----|------|-----|----------|------|--------|------|--------|------|
| | | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % |
| Erhaltung Oberfläche | gut | 6 | 18,2 | 2 | 40 | 3 | 30 | 2 | 22,2 | 48 | 19,6 | 61 | 20,2 |
| | mittel | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 60 | 0 | 0 | 28 | 11,4 | 35 | 11,6 |
| | schlecht | 26 | 78,8 | 3 | 60 | 1 | 10 | 7 | 77,8 | 169 | 69 | 206 | 68,2 |
| Bruchkante | vollständig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,1 | 0 | 0 | 1 | 0,3 |
| | scharfkantig | 20 | 60,6 | 5 | 100 | 6 | 60 | 4 | 44,4 | 114 | 46,5 | 149 | 49,3 |
| | leicht verrundet | 12 | 36,4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 3 | 33,3 | 73 | 29,8 | 92 | 30,5 |
| | stark verrundet | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11,1 | 58 | 23,7 | 60 | 19,9 |
| Verbrennung | keine | 33 | 100 | 4 | 80 | 10 | 100 | 9 | 100 | 244 | 99,6 | 300 | 99,3 |
| | Verbr. bis 550°C | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,4 | 2 | 0,7 |
| Verbiss | nicht verbissen | 32 | 97 | 5 | 100 | 10 | 100 | 9 | 100 | 245 | 100 | 301 | 99,7 |
| | Carnivore | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,3 |
| Durchschnittsgewicht (g) | | 8,4 | | 2,1 | | 1,4 | | 14,2 | | 0,6 | | 1,9 | |

Tab. A5.1: Eching. Erhaltung des Materials.

| Skelettteil | Knochenzahl | | Knochengewicht | | Abweichung |
|---------------------------|-------------|------------|----------------|-------------|-------------|
| | n | % | g | % | % |
| Dens superior | 1 | 5 | 5 | 5,4 | k. A. |
| Mandibula | 12 | 60 | 28,2 | 30,4 | 24,1 |
| Dens inferior | 3 | 15 | 53,8 | 58 | k. A. |
| Dens superior/inferior | 3 | 15 | 2,2 | 2,4 | k. A. |
| Kopfskelett gesamt | 19 | 95 | 89,2 | 96,2 | 78,6 |
| Tarsalia | 1 | 5 | 3,5 | 3,8 | 1,1 |
| Autopodium gesamt | 1 | 5 | 3,5 | 3,8 | -8,3 |
| Gesamt | 20 | 100 | 92,7 | 100 | - |

Tab. A5.2: Echting D. Verteilung der Skelettelemente beim Rind.